


INSERINDO O ANDALAN SILVERFLEX


ETAPA 1

Introduza suavemente a estrutura de inserção preenchida através do canal cervical e avance para cima até que o flange entre em contato com o orifício cervical. Assegure-se que a flange está no plano horizontal, como mostra a Fig. 4.



ETAPA 2

Segurando a haste sólida imóvel com uma mão, retire o tubo de inserção com sua mão livre para tocar a parte nervurada da haste sólida, assim o flange também é removido do orifício cervical (aproximadamente 1,5 cm). Agora, os braços da estrutura estão desdobrados, como mostra a Fig. 5.




ETAPA 3

Insira o tubo de inserção até que o flange toque novamente o orifício cervical. Agora, o ANDALAN SILVERFLEX está em contato com o fundo, como mostra a Fig. 6.



ETAPA 4

Para retirar inteiramente o dispositivo do tubo de inserção, segure firmemente a haste sólida e retire o fundo do tubo e o anteparo, como mostra a Fig. 7.



ETAPA 5

Primeiramente, remova de forma suave a haste sólida (segure o tubo imóvel enquanto remove a haste sólida), depois o tubo de inserção do canal cervical para evitar que puxe o dispositivo da posição do fundo. Corte os fios de modo que fiquem visíveis e deixe de 3 a 4 cm para fora do colo uterino, como mostra a Fig. 8.



ETAPA 6

Auxilie a paciente a sair da mesa vagarosamente (fique alerta para possível tontura) e a instrua sobre como e quando verificar os fios. Deixe que ela mesma verifique os fios. Faça perguntas e a instrua sobre seu retorno e sobre o que fazer, quem e como contatar para ajuda, caso necessário.

VALIDADE DO ANDALAN SILVERFLEX

ANDALAN SILVERFLEX Cu 380 Ag tem prazo de validade de 5 anos e possui vida útil de 5 anos após inserido.

PROCEDIMENTO PARA REMOÇÃO

Usando uma técnica suave e sem toque (asséptica), execute as seguintes etapas para remover o dispositivo intrauterino:

PASSO 1: Dê à mulher uma breve visão geral do procedimento, encoraje-a a fazer perguntas e tranquilize-a conforme necessário. Lembre-a de avisá-lo se sentir alguma dor.

PASSO 2: Coloque luvas limpas/desinfetadas de alto nível em ambas as mãos.

PASSO 3: Insira um espéculo desinfetado de alto nível (ou estéril) e visualize o colo do útero e os fios do dispositivo intrauterino. Se os fios não puderem ser vistos, gerecencie como fios ausentes.

PASSO 4: Aplique um antisséptico apropriado (por exemplo, iodopovidona ou clorexidina) duas ou mais vezes no colo do útero (limpando de dentro para fora do orifício) e vagina. Se for usado iodopovidona, certifique-se de que a mulher não é alérgica ao iodo e espere 2 minutos para que a solução atue. Peça que ela respire lenta e profundamente e relaxe. Informe que ela pode sentir algum desconforto e cólicas, o que é normal. Não use força em nenhuma etapa deste procedimento. Segure os fios do dispositivo intrauterino com um fórceps desinfetado (ou estéril). Aplique uma tração constante, mas suave, puxando os fios gentilmente em sua direção com o fórceps. O dispositivo geralmente pode ser removido sem dificuldade. Se os fios quebrarem, mas o dispositivo intrauterino

estiver visível, segure o dispositivo com a pinça e remova-o. Se a remoção for difícil, não use força excessiva.

Ações a serem tomadas em caso de dificuldade de remover o ANDALAN SILVERFLEX.

Tente uma torção suave e lenta do dispositivo intrauterino enquanto puxa gentilmente.

• Continue enquanto a mulher estiver confortável.

Se o dispositivo intrauterino ainda não puder ser removido, encaminhe a mulher para um profissional especialmente treinado que possa dilatar o colo do útero.

Se parecer haver um ângulo agudo entre o útero e o colo do útero:

• Coloque um fórceps desinfetado (ou estéril) no colo do útero e aplique uma tração suave para baixo e para fora.

• Tente uma torção suave e lenta do dispositivo intrauterino enquanto puxa gentilmente.

• Continue enquanto a mulher estiver confortável.

Se o dispositivo intrauterino ainda não puder ser removido, encaminhe a mulher para um profissional especialmente treinado.

Dificuldades na remoção e quebra durante o procedimento

Caso haja necessidade de maior força que a usual para retirada do ANDALAN SILVERFLEX, deve-se considerar a possibilidade de incrustação. Caso haja incrustação, os fragmentos retidos podem ser expelidos sem dor durante a menstruação e as laterais incrustadas podem ser liberadas por contrações uterinas.

Se o ANDALAN SILVERFLEX ou parte dele estiver perdido na cavidade uterina, devem ser realizados histeroscopia, ultrasonografia e raios-X para determinar sua localização.

Curtagem pode ser aconselhável. Em casos muito raros de perfuração uterina, a laparoscopia pode ser necessária.

No final da vida útil ou na remoção após o uso, elimine os itens conforme as regulamentações locais, como as que visam à eliminação de resíduos médicos não recicláveis (RDC 222 de 28

de março de 2018 e suas atualizações). O ANDALAN SILVERFLEX é um produto para uso único e não deverá ser reutilizado. Isto poderá resultar em infecções e perda de eficácia.

• Continue enquanto a mulher estiver confortável.

Se o dispositivo intrauterino ainda não puder ser removido, encaminhe a mulher para um profissional especialmente treinado.

• Continue enquanto a mulher estiver confortável.

Se o dispositivo intrauterino ainda não puder ser removido, encaminhe a mulher para um profissional especialmente treinado.

• Continue enquanto a mulher estiver confortável.

Se o dispositivo intrauterino ainda não puder ser removido, encaminhe a mulher para um profissional especialmente treinado.

• Continue enquanto a mulher estiver confortável.

Se o dispositivo intrauterino ainda não puder ser removido, encaminhe a mulher para um profissional especialmente treinado.

• Continue enquanto a mulher estiver confortável.

Se o dispositivo intrauterino ainda não puder ser removido, encaminhe a mulher para um profissional especialmente treinado.

• Continue enquanto a mulher estiver confortável.

Se o dispositivo intrauterino ainda não puder ser removido, encaminhe a mulher para um profissional especialmente treinado.

• Continue enquanto a mulher estiver confortável.

Se o dispositivo intrauterino ainda não puder ser removido, encaminhe a mulher para um profissional especialmente treinado.

• Continue enquanto a mulher estiver confortável.

Se o dispositivo intrauterino ainda não puder ser removido, encaminhe a mulher para um profissional especialmente treinado.

• Continue enquanto a mulher estiver confortável.

Se o dispositivo intrauterino ainda não puder ser removido, encaminhe a mulher para um profissional especialmente treinado.

• Continue enquanto a mulher estiver confortável.

Se o dispositivo intrauterino ainda não puder ser removido, encaminhe a mulher para um profissional especialmente treinado.

• Continue enquanto a mulher estiver confortável.

Se o dispositivo intrauterino ainda não puder ser removido, encaminhe a mulher para um profissional especialmente treinado.

• Continue enquanto a mulher estiver confortável.

Se o dispositivo intrauterino ainda não puder ser removido, encaminhe a mulher para um profissional especialmente treinado.

• Continue enquanto a mulher estiver confortável.

Se o dispositivo intrauterino ainda não puder ser removido, encaminhe a mulher para um profissional especialmente treinado.

• Continue enquanto a mulher estiver confortável.

Se o dispositivo intrauterino ainda não puder ser removido, encaminhe a mulher para um profissional especialmente treinado.

• Continue enquanto a mulher estiver confortável.

Se o dispositivo intrauterino ainda não puder ser removido, encaminhe a mulher para um profissional especialmente treinado.

• Continue enquanto a mulher estiver confortável.

Se o dispositivo intrauterino ainda não puder ser removido, encaminhe a mulher para um profissional especialmente treinado.

• Continue enquanto a mulher estiver confortável.

Se o dispositivo intrauterino ainda não puder ser removido, encaminhe a mulher para um profissional especialmente treinado.

• Continue enquanto a mulher estiver confortável.

Se o dispositivo intrauterino ainda não puder ser removido, encaminhe a mulher para um profissional especialmente treinado.

• Continue enquanto a mulher estiver confortável.

Se o dispositivo intrauterino ainda não puder ser removido, encaminhe a mulher para um profissional especialmente treinado.

• Continue enquanto a mulher estiver confortável.

Se o dispositivo intrauterino ainda não puder ser removido, encaminhe a mulher para um profissional especialmente treinado.

• Continue enquanto a mulher estiver confortável.

Se o dispositivo intrauterino ainda não puder ser removido, encaminhe a mulher para um profissional especialmente treinado.

• Continue enquanto a mulher estiver confortável.

Se o dispositivo intrauterino ainda não puder ser removido, encaminhe a mulher para um profissional especialmente treinado.

• Continue enquanto a mulher estiver confortável.

Se o dispositivo intrauterino ainda não puder ser removido, encaminhe a mulher para um profissional especialmente treinado.

• Continue enquanto a mulher estiver confortável.

Se o dispositivo intrauterino ainda não puder ser removido, encaminhe a mulher para um profissional especialmente treinado.

• Continue enquanto a mulher estiver confortável.

ocorrer um leve sangramento intermenstrual ou spotting (pequenos sangramentos menstruais) mas geralmente desaparece espontaneamente. Em algumas mulheres pode haver recorrência por vários ciclos.

Pode ocorrer prolongamento da menstruação e um aumento do fluxo menstrual. Pode haver aparecimento ou agravamento de amenorreia.

• Continue enquanto a mulher estiver confortável.

Se o dispositivo intrauterino ainda não puder ser removido, encaminhe a mulher para um profissional especialmente treinado.

• Continue enquanto a mulher estiver confortável.

Se o dispositivo intrauterino ainda não puder ser removido, encaminhe a mulher para um profissional especialmente treinado.

• Continue enquanto a mulher estiver confortável.

Se o dispositivo intrauterino ainda não puder ser removido, encaminhe a mulher para um profissional especialmente treinado.

• Continue enquanto a mulher estiver confortável.

Se o dispositivo intrauterino ainda não puder ser removido, encaminhe a mulher para um profissional especialmente treinado.

• Continue enquanto a mulher estiver confortável.

Se o dispositivo intrauterino ainda não puder ser removido, encaminhe a mulher para um profissional especialmente treinado.

• Continue enquanto a mulher estiver confortável.

Se o dispositivo intrauterino ainda não puder ser removido, encaminhe a mulher para um profissional especialmente treinado.

• Continue enquanto a mulher estiver confortável.

Se o dispositivo intrauterino ainda não puder ser removido, encaminhe a mulher para um profissional especialmente treinado.

• Continue enquanto a mulher estiver confortável.

Se o dispositivo intrauterino ainda não puder ser removido, encaminhe a mulher para um profissional especialmente treinado.

• Continue enquanto a mulher estiver confortável.

Se o dispositivo intrauterino ainda não puder ser removido, encaminhe a mulher para um profissional especialmente treinado.

• Continue enquanto a mulher estiver confortável.

Se o dispositivo intrauterino ainda não puder ser removido, encaminhe a mulher para um profissional especialmente treinado.

• Continue enquanto a mulher estiver confortável.

Se o dispositivo intrauterino ainda não puder ser removido, encaminhe a mulher para um profissional especialmente treinado.

• Continue enquanto a mulher estiver confortável.

Se o dispositivo intrauterino ainda não puder ser removido, encaminhe a mulher para um profissional especialmente treinado.

• Continue enquanto a mulher estiver confortável.

Se o dispositivo intrauterino ainda não puder ser removido, encaminhe a mulher para um profissional especialmente treinado.

• Continue enquanto a mulher estiver confortável.

Se o dispositivo intrauterino ainda não puder ser removido, encaminhe a mulher para um profissional especialmente treinado.

• Continue enquanto a mulher estiver confortável.

Se o dispositivo intrauterino ainda não puder ser removido, encaminhe a mulher para um profissional especialmente treinado.

• Continue enquanto a mulher estiver confortável.

Se o dispositivo intrauterino ainda não puder ser removido, encaminhe a mulher para um profissional especialmente treinado.

• Continue enquanto a mulher estiver confortável.

Se o dispositivo intrauterino ainda não puder ser removido, encaminhe a mulher para um profissional especialmente treinado.

• Continue enquanto a mulher estiver confortável.

Se o dispositivo intrauterino ainda não puder ser removido, encaminhe a mulher para um profissional especialmente treinado.

• Continue enquanto a mulher estiver confortável.

Se o dispositivo intrauterino ainda não puder ser removido, encaminhe a mulher para um profissional especialmente treinado.

• Continue enquanto a mulher estiver confortável.

Se o dispositivo intrauterino ainda não puder ser removido, encaminhe a mulher para um profissional especialmente treinado.

• Continue enquanto a mulher estiver confortável.

Se o dispositivo intrauterino ainda não puder ser removido, encaminhe a mulher para um profissional especialmente treinado.

• Continue enquanto a mulher estiver confortável.

Se o dispositivo intrauterino ainda não puder ser removido, encaminhe a mulher para um profissional especialmente treinado.

• Continue enquanto a mulher estiver confortável.

Se o dispositivo intrauterino ainda não puder ser removido, encaminhe a mulher para um profissional especialmente treinado.

• Continue enquanto a mulher estiver confortável.

Se o dispositivo intrauterino ainda não puder ser removido, encaminhe a mulher para um profissional especialmente treinado.

• Continue enquanto a mulher estiver confortável.

Se o dispositivo intrauterino ainda não puder ser removido, encaminhe a mulher para um profissional especialmente treinado.

• Continue enquanto a mulher estiver confortável.

Se o dispositivo intrauterino ainda não puder ser removido, encaminhe a mulher para um profissional especialmente treinado.

• Continue enquanto a mulher estiver confortável.

Se o dispositivo intrauterino ainda não puder ser removido, encaminhe a mulher para um profissional especialmente treinado.

• Continue enquanto a mulher estiver confortável.

Se o dispositivo intrauterino ainda não puder ser removido, encaminhe a mulher para um profissional especialmente treinado.

• Continue enquanto a mulher estiver confortável.

Se o dispositivo intrauterino ainda não puder ser removido, encaminhe a mulher para um profissional especialmente treinado.

• Continue enquanto a mulher estiver confortável.

Se o dispositivo intrauterino ainda não puder ser removido, encaminhe a mulher para um profissional especialmente treinado.

• Continue enquanto a mulher estiver confortável.

Se o dispositivo intrauterino ainda não puder ser removido, encaminhe a mulher para um profissional especialmente treinado.

• Continue enquanto a mulher estiver confortável.

Se o dispositivo intrauterino ainda não puder ser removido, encaminhe a mulher para um profissional especialmente treinado.

• Continue enquanto a mulher estiver confortável.

DISPOSITIVO INTRAUTERINO

Andalan SILVERFLEX

Informações para o profissional da saúde habilitado

Cu 380Ag



MECANISMO DE AÇÃO

O mecanismo de ação do ANDALAN SILVERFLEX consiste em criar um ambiente intrauterino hostil aos espermatozoides intensificado pelo cobre. Evita a sua chegada até as trompas e tem efeito espermicida pela liberação de cobre que altera a composição do muco cervical reduzindo a mobilidade deste. O útero reage ao dispositivo intrauterino como a um corpo estranho com uma reação inflamatória, gerando alteração celular e bioquímica do endométrio e fluidos uterinos o que interfere na migração dos espermatozoides, na fertilização e no transporte do óvulo impedindo a nidação (fixação no útero).

A liberação contínua de cobre na cavidade uterina pelo fio de cobre contendo em seu núcleo um fio de prata intensifica o efeito contraceptivo do ANDALAN SILVERFLEX. O fio de prata retém a liberação de cobre tornando-a mais lenta e não há interação/liberação da prata na cavidade uterina.

• Continue enquanto a mulher estiver confortável.

Se o dispositivo intrauterino ainda não puder ser removido, encaminhe a mulher para um profissional especialmente treinado.

• Continue enquanto a mulher estiver confortável.

Se o dispositivo intrauterino ainda não puder ser removido, encaminhe a mulher para um profissional especialmente treinado.

• Continue enquanto a mulher estiver confortável.

Se o dispositivo intrauterino ainda não puder ser removido, encaminhe a mulher para um profissional especialmente treinado.

• Continue enquanto a mulher estiver confortável.

Se o dispositivo intrauterino ainda não puder ser removido, encaminhe a mulher para um profissional especialmente treinado.

• Continue enquanto a mulher estiver confortável.

Se o dispositivo intrauterino ainda não puder ser removido, encaminhe a mulher para um profissional especialmente treinado.

• Continue enquanto a mulher estiver confortável.

Se o dispositivo intrauterino ainda não puder ser removido, encaminhe a mulher para um profissional especialmente treinado.

• Continue enquanto a mulher estiver confortável.

Se o dispositivo intrauterino ainda não puder ser removido, encaminhe a mulher para um profissional especialmente treinado.

• Continue enquanto a mulher estiver confortável.

Se o dispositivo intrauterino ainda não puder ser removido, encaminhe a mulher para um profissional especialmente treinado.

• Continue enquanto a mulher estiver confortável.

Se o dispositivo intrauterino ainda não puder ser removido, encaminhe a mulher para um profissional especialmente treinado.

• Continue enquanto a mulher estiver confortável.

Se o dispositivo intrauterino ainda não puder ser removido, encaminhe a mulher para um profissional especialmente treinado.

• Continue enquanto a mulher estiver confortável.

Se o dispositivo intrauterino ainda não puder ser removido, encaminhe a mulher para um profissional especialmente treinado.

• Continue enquanto a mulher estiver confortável.

Se o dispositivo intrauterino ainda não puder ser removido, encaminhe a mulher para um profissional especialmente treinado.

• Continue enquanto a mulher estiver confortável.

Se o dispositivo intrauterino ainda não puder ser removido, encaminhe a mulher para um profissional especialmente treinado.

• Continue enquanto a mulher estiver confortável.

Se o dispositivo intrauterino ainda não puder ser removido, encaminhe a mulher para um profissional especialmente treinado.

• Continue enquanto a mulher estiver confortável.

Se o dispositivo intrauterino ainda não puder ser removido, encaminhe a mulher para um profissional especialmente treinado.

• Continue enquanto a mulher estiver confortável.

Se o dispositivo intrauterino ainda não puder ser removido, encaminhe a mulher para um profissional especialmente treinado.

• Continue enquanto a mulher estiver confortável.

Se o dispositivo intrauterino ainda não puder ser removido, encaminhe a mulher para um profissional especialmente treinado.

• Continue enquanto a mulher estiver confortável.

Se o dispositivo intrauterino ainda não puder ser removido, encaminhe a mulher para um profissional especialmente treinado.

• Continue enquanto a mulher estiver confortável.

Se o dispositivo intrauterino ainda não puder ser removido, encaminhe a mulher para um profissional especialmente treinado.

• Continue enquanto a mulher estiver confortável.

Se o dispositivo intrauterino ainda não puder ser removido, encaminhe a mulher para um profissional especialmente treinado.

• Continue enquanto a mulher estiver confortável.

Se o dispositivo intrauterino ainda não puder ser removido, encaminhe a mulher para um profissional especialmente treinado.

• Continue enquanto a mulher estiver confortável.

Se o dispositivo intrauterino ainda não puder ser removido, encaminhe a mulher para um profissional especialmente treinado.

• Continue enquanto a mulher estiver confortável.

Se o dispositivo intrauterino ainda não puder ser removido, encaminhe a mulher para um profissional especialmente treinado.

• Continue enquanto a mulher estiver confortável.

Se o dispositivo intrauterino ainda não puder ser removido, encaminhe a mulher para um profissional especialmente treinado.

• Continue enquanto a mulher estiver confortável.

Se o dispositivo intrauterino ainda não puder ser removido, encaminhe a mulher para um profissional especialmente treinado.

• Continue enquanto a mulher estiver confortável.

Se o dispositivo intrauterino ainda não puder ser removido, encaminhe a mulher para um profissional especialmente treinado.

• Continue enquanto a mulher estiver confortável.

Se o dispositivo intrauterino ainda não puder ser removido, encaminhe a mulher para um profissional especialmente treinado.

• Continue enquanto a mulher estiver confortável.

Se o dispositivo intrauterino ainda não puder ser removido, encaminhe a mulher para um profissional especialmente treinado.

• Continue enquanto a mulher estiver confortável.

Se o dispositivo intrauterino ainda não puder ser removido, encaminhe a mulher para um profissional especialmente treinado.

• Continue enquanto a mulher estiver confortável.

Se o dispositivo intrauterino ainda não puder ser removido, encaminhe a mulher para um profissional especialmente treinado.

• Continue enquanto a mulher estiver confortável.

Se o dispositivo intrauterino ainda não puder ser removido, encaminhe a mulher para um profissional especialmente treinado.

• Continue enquanto a mulher estiver confortável.

Se o dispositivo intrauterino ainda não puder ser removido, encaminhe a mulher para um profissional especialmente treinado.

• Continue enquanto a mulher estiver confortável.

Se o dispositivo intrauterino ainda não puder ser removido, encaminhe a mulher para um profissional especialmente treinado.

• Continue enquanto a mulher estiver confortável.

Se o dispositivo intrauterino ainda não puder ser removido, encaminhe a mulher para um profissional especialmente treinado.

• Continue enquanto a mulher estiver confortável.

Se o dispositivo intrauterino ainda não puder ser removido, encaminhe a mulher para um profissional especialmente treinado.

• Continue enquanto a mulher estiver confortável.


INFORMAÇÕES PARA O PROFISSIONAL DA SAÚDE HABILITADO CARACTERÍSTICAS GERAIS

ANDALAN SILVERFLEX é um dispositivo contraceptivo intrauterino constituído de polietileno de baixa densidade, com propriedades viscoelásticas. O braço vertical é envolto por um fio de cobre (99,9% de pureza). O fio de cobre tem como superfície de contato total de aproximadamente 380mm² de cobre para o **ANDALAN SILVERFLEX**. Os braços laterais são flexíveis e moldados de tal forma para manter o **ANDALAN SILVERFLEX** adjacente ao fundo do útero sem esticar ou tocar o corno.

Seu corpo plástico contém de 15% a 25% de Sulfato de Bário para torná-lo radiopaco.

O produto é estéril desde que a embalagem esteja intacta. É esterilizado por radiação gama. Os 03 etiquetas de rastreabilidade do **ANDALAN SILVERFLEX** estão disponíveis no interior da embalagem do produto (as etiquetas devem, obrigatoriamente, ser fixadas no prontuário clínico, no documento a ser entregue a paciente e na documentação fiscal).

ANDALAN SILVERFLEX Cu 380 Ag DISPOSITIVO INTRAUTERINO



- a. Braço vertical.
- b. Braço horizontal.
- c. Fio de cobre com núcleo de prata.
- d. Fio de náilon.
- e. Haste sólida.
- f. Flange (marcador de profundidade).
- g. Tubo de inserção.

INDICAÇÃO

ANDALAN SILVERFLEX é indicado para contracepção de longo prazo e reversível para mulheres em idade fértil.

É um método contraceptivo recomendado para uso durante o período de aleitamento materno uma vez que não interfere na lactação.

Não protege contra infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) e, portanto, recomenda-se uso conjunto de preservativo.

CONTRAINDICAÇÃO (ABSOLUTA):

- Doenças malignas do trato genital.
- Sangramento vaginal não diagnosticado.
- Gravidez.
- Histórico anterior de gravidez ectópica ou fatores de pré-disposição.
- Infecções no trato genital (exceto candidíase).
- Infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) durante os últimos 12 meses (Exceto vaginite bacteriana, infecções por herpes repetidas e hepatite B).
- Aborto séptico durante os últimos 3 meses;
- Doenças inflamatórias da pélvis;
- Malformação uterina (congénita ou adquirida);
- Alergia ao cobre;

CONTRAINDICAÇÃO (RELATIVA):

- Anemia.
- Cardiopatias valvulares.
- O uso de dispositivo intrauterino nestes casos pode aumentar o risco de endocardite bacteriana subaguda. Deve-se buscar orientação médica para profilaxia com antibiótico ao inserir ou remover o **ANDALAN SILVERFLEX**.
- Distúrbios de coagulação.
- Tratamento anti-inflamatório.
- Doença de Wilson.
- Exposição múltipla a parceiros sexuais diferentes.

PRECAUÇÕES

ANDALAN SILVERFLEX não protege contra o vírus HIV (AIDS) ou qualquer outra infecção sexualmente transmissível (IST).

A inserção do **ANDALAN SILVERFLEX** pode desencadear ataque em mulher com epilepsia, por isso recomenda-se cuidado especial durante a inserção.

Pode ocorrer cólica resultante da inserção, geralmente por pouco tempo, porém pode durar por várias horas e até mesmo por dias.

Doenças Inflamatórias Pélvicas (DIP)

O risco de desenvolvimento de DIP em mulheres com dispositivo intrauterino é maior nos primeiros 20 dias após a inserção. Passando este período o risco é igual ao de mulheres que não utilizam o dispositivo intrauterino. A inflamação pode ser decorrente de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). A DIP pode levar a oclusão tubária, prejudicando a fertilidade futura, aumentando o risco de gravidez ectópica subsequente e, caso haja desenvolvimento de um abscesso tubo-ovariano, pode ser necessária histerectomia ou ovariectomia. Assim, em mulheres nulíparas e naquelas com histórico recente de tratamento de infecções pélvicas, os benefícios contraceptivos do **ANDALAN SILVERFLEX** devem ser pesados contra os potenciais riscos.

A DIP pode ser averiguada através de exame ginecológico e/ou ultrassonografia. Em caso de confirmação de DIP deve-se iniciar um tratamento antibiótico através de orientação médica. Se o tratamento não apresentar resultados positivos após 48 horas, o **ANDALAN SILVERFLEX** deve ser imediatamente removido.

Infecção pélvica

Caso ocorra infecção pélvica com o uso do **ANDALAN SILVERFLEX**, ele deve ser imediatamente removido.

Devem-se realizar análises bacteriológicas para ser aplicada a terapia adequada na mulher.

Caso a infecção não seja tratada e o dispositivo intrauterino não for removido, pode-se evoluir para um quadro de abscessos tubo-ovariano ou peritonite generalizada.

Incrustação ou Inclusão

Caso o **ANDALAN SILVERFLEX** esteja incrustado ou tenha sofrido inclusão deve-se ter maior atenção durante a remoção do dispositivo intrauterino.

Perfuração

A perfuração pode ocorrer durante a inserção do dispositivo intrauterino.

Na perfuração, pode ocorrer a penetração total ou parcial do dispositivo intrauterino. Caso ocorra, o **ANDALAN SILVERFLEX** deverá ser removido e substituído a terapia adequada conforme a orientação médica.

Se o **ANDALAN SILVERFLEX** permanecer no útero após a perfuração, poderão ocorrer aderências, reações de corpo estranho, obstrução e perfuração de alças intestinais.

QUANDO O ANDALAN SILVERFLEX DEVE SER INSERIDO?

O **ANDALAN SILVERFLEX** deve ser inserido por um profissional da saúde habilitado em um estabelecimento de saúde garantindo as condições técnicas e de assepsia necessárias após exame clínico ginecológico.

Devem ser consideradas as indicações e contra-indicações do método, avaliando seus riscos e benefícios.

O **ANDALAN SILVERFLEX** não deve ser inserido em casos de gravidez.

O melhor momento para a inserção se dá durante a menstruação, para prevenir a inserção durante uma gravidez não diagnosticada. Neste momento, o orifício cervical externo e cervical interno está fisiologicamente dilatado. Isso facilita a inserção do **ANDALAN SILVERFLEX** sem a necessidade de dilatar o canal, na maioria dos casos.

Pós-coito

O **ANDALAN SILVERFLEX** pode ser inserido em até 120 horas ou 5 dias após o coito desprotegido.

A inserção imediata após o coito desprotegido pode aumentar o risco de DIP (doença inflamatória pélvica).

Pós-aborto

O **ANDALAN SILVERFLEX** deve ser inserido 15 minutos após o aborto, porém, nestes casos a taxa de expulsão é mais alta.

Caso o **ANDALAN SILVERFLEX** não possa ser inserido imediatamente após o aborto, a inserção deve ser postergada para no mínimo 6 semanas.

Pós-parto

Em caso de cesariana, a inserção deve ser postergada para no mínimo 12 semanas após o parto.

Em caso de parto normal, a inserção deve ocorrer após 15 minutos da expulsão da placenta, porém, nestes casos a taxa de expulsão é mais alta.

Caso o **ANDALAN SILVERFLEX** não possa ser inserido imediatamente após a expulsão da placenta, a inserção deve ser prorrogada para no mínimo 6 semanas.

A inserção nestes casos não prejudica a involução uterina ou a amamentação.

NOTA: O profissional da saúde habilitado deve levar em conta o risco de infecção pélvica associada à inserção emergencial do **ANDALAN SILVERFLEX**, devendo orientar a mulher adequadamente a este respeito.

ADVERTÊNCIAS

Não use o **ANDALAN SILVERFLEX** se a embalagem interna estiver danificada ou aberta. O dispositivo intrauterino é apresentado em acondicionamento estéril, não deve ser aberto até o momento de sua inserção.

Não use qualquer parte ou componente do dispositivo que possa ter caído no chão ou sofrido alguma contaminação.

Não derrame o conteúdo da embalagem na bandeja de instrumentos.

Não use a haste sólida branca para medir o comprimento da cavidade uterina.

SIGA AS INSTRUÇÕES DE USO CORRETAMENTE.

EXAMES MÉDICOS PRÉ E PÓS-INSERÇÃO

Pré-inserção

O **ANDALAN SILVERFLEX** deve ser inserido após verificação médica para assegurar-se de que a mulher não se enquadra em nenhuma das contra-indicações, realizando exames físico e verificando histórico médico. Os exames físicos devem incluir:

- Exame Ginecológico.
- Exame de Papanicolau.
- Exames adequados para infecções sexualmente transmissíveis (ISTs).
- Também é aconselhável que seja realizada cultura vaginal e cervical antes da inserção do **ANDALAN SILVERFLEX** para a prevenção de doenças inflamatórias pélvicas (DIP).

Pós-inserção

A mulher deve fazer um acompanhamento com profissional da saúde habilitado. Logo após o primeiro período menstrual a mulher deve ser reexaminada para determinar se o dispositivo intrauterino está inserido adequadamente e se há sinais de infecção.

Se a inserção ocorrer pós-aborto ou pós-parto, a mulher deve ser reexaminada mensalmente durante os três primeiros meses. Após os três meses, a mulher pode ser reexaminada semestralmente.

Caso a mulher não sinta o dispositivo intrauterino **ANDALAN SILVERFLEX** durante o autotaxame e não tenha observado a expulsão, deve-se verificar se não houve perfuração ou expulsão despercebida.

Radiografias e ultrassom podem ser utilizados para localizar o **ANDALAN SILVERFLEX**.

Sangramento excessivo ou dismenorria durante o primeiro ciclo após a inserção também deve ser cuidadosamente avaliado. Caso estas ocorrências se relacionem ao **ANDALAN SILVERFLEX**, o mesmo deverá ser removido.

A possibilidade de perfuração do útero durante a inserção deve ser sempre considerada, especialmente se o fio de náilon for invisível ou não puder ser retirado do canal cervical.

Caso haja quaisquer dúvidas (caso seja extremamente difícil ou dolorosa, a inserção do **ANDALAN SILVERFLEX**), as técnicas apropriadas de diagnóstico devem ser usadas (raio-X plano da pélvis, ultrassonografia, histeroscopia, laparoscopia). Caso o fio de náilon aparente ser mais longo do que era quando foi inserido, uma ultrassonografia deve ser realizada para determinar se o **ANDALAN SILVERFLEX** foi deslocado, o que pode diminuir sua eficácia contraceptiva.

ANTES DA INSERÇÃO O PROFISSIONAL DA SAÚDE HABILITADO DEVE INFORMAR A MULHER:

A necessidade de ler as "Informações para a Mulher" e seguir as instruções.

Mulheres que desejam uma futura gravidez devem ser informadas do pequeno aumento do risco de doença inflamatória pélvica e suas possíveis interferências com a fertilidade.

A mulher deve ser instruída de como sentir os fios do **ANDALAN SILVERFLEX** após o final da menstruação e assegurar-se que não há nenhum pedaço de plástico saliente.

A mulher deve ser informada detalhadamente sobre vantagens e desvantagens da contracepção do **ANDALAN SILVERFLEX**, não somente para que haja compreensão de seu funcionamento, mas acima de tudo para que quaisquer complicações possam ser detectadas com antecedência. O profissional da saúde habilitado deverá encorajar a mulher a fazer uma visita de acompanhamento em caso de qualquer problema ou dúvidas relacionadas ao uso do **ANDALAN SILVERFLEX**. Durante o acompanhamento, o profissional da saúde habilitado deverá prestar uma atenção especial aos seguintes pontos:

■ Sangramento mais forte indica a possibilidade de anemia.

■ Se ocorrer a gravidez, o **ANDALAN SILVERFLEX** deve ser removido.

■ Se a mulher engravidar com o uso do **ANDALAN SILVERFLEX**, existe a possibilidade de haver uma gravidez ectópica, que deverá ser avaliada.

■ Se a mulher estiver exposta a condições que aumentem substancialmente o risco de doenças pélvicas inflamatórias, aconselha-se a remoção do **ANDALAN SILVERFLEX**.

■ Sinais e sintomas de infecção devem ser relatados.

■ Caso o **ANDALAN SILVERFLEX** seja expelido, informe ao profissional da saúde habilitado. Não há continuidade de proteção contraceptiva após a expulsão.

■ A mulher deve retornar ao profissional da saúde habilitado para examinar ou para a substituição do **ANDALAN SILVERFLEX** (ao final da validade), conforme instruído pelo profissional da saúde habilitado.

■ Caso sua menstruação esteja atrasada e há sintomas de gravidez a mulher deve informar imediatamente o profissional da saúde habilitado.

■ Caso haja dor abdominal, dores durante a relação sexual, infecções (como gonorréia), secreção anormal, febre e calafrios, a mulher deve consultar o profissional da saúde habilitado.

■ Caso sua menstruação esteja atrasada e há sintomas de gravidez a mulher deve informar imediatamente o profissional da saúde habilitado.

■ Caso haja dor abdominal, dores durante a relação sexual, infecções (como gonorréia), secreção anormal, febre e calafrios, a mulher deve consultar o profissional da saúde habilitado.

■ Caso sua menstruação esteja atrasada e há sintomas de gravidez a mulher deve informar imediatamente o profissional da saúde habilitado.

■ Caso haja dor abdominal, dores durante a relação sexual, infecções (como gonorréia), secreção anormal, febre e calafrios, a mulher deve consultar o profissional da saúde habilitado.

■ Caso sua menstruação esteja atrasada e há sintomas de gravidez a mulher deve informar imediatamente o profissional da saúde habilitado.

■ Caso haja dor abdominal, dores durante a relação sexual, infecções (como gonorréia), secreção anormal, febre e calafrios, a mulher deve consultar o profissional da saúde habilitado.

■ Caso sua menstruação esteja atrasada e há sintomas de gravidez a mulher deve informar imediatamente o profissional da saúde habilitado.

■ Caso haja dor abdominal, dores durante a relação sexual, infecções (como gonorréia), secreção anormal, febre e calafrios, a mulher deve consultar o profissional da saúde habilitado.

■ Caso sua menstruação esteja atrasada e há sintomas de gravidez a mulher deve informar imediatamente o profissional da saúde habilitado.

■ Caso haja dor abdominal, dores durante a relação sexual, infecções (como gonorréia), secreção anormal, febre e calafrios, a mulher deve consultar o profissional da saúde habilitado.

■ Caso sua menstruação esteja atrasada e há sintomas de gravidez a mulher deve informar imediatamente o profissional da saúde habilitado.

■ Caso haja dor abdominal, dores durante a relação sexual, infecções (como gonorréia), secreção anormal, febre e calafrios, a mulher deve consultar o profissional da saúde habilitado.

■ Caso sua menstruação esteja atrasada e há sintomas de gravidez a mulher deve informar imediatamente o profissional da saúde habilitado.

■ Caso haja dor abdominal, dores durante a relação sexual, infecções (como gonorréia), secreção anormal, febre e calafrios, a mulher deve consultar o profissional da saúde habilitado.

■ Caso sua menstruação esteja atrasada e há sintomas de gravidez a mulher deve informar imediatamente o profissional da saúde habilitado.

■ Caso haja dor abdominal, dores durante a relação sexual, infecções (como gonorréia), secreção anormal, febre e calafrios, a mulher deve consultar o profissional da saúde habilitado.

■ Caso sua menstruação esteja atrasada e há sintomas de gravidez a mulher deve informar imediatamente o profissional da saúde habilitado.

■ Caso haja dor abdominal, dores durante a relação sexual, infecções (como gonorréia), secreção anormal, febre e calafrios, a mulher deve consultar o profissional da saúde habilitado.

■ Caso sua menstruação esteja atrasada e há sintomas de gravidez a mulher deve informar imediatamente o profissional da saúde habilitado.

■ Caso haja dor abdominal, dores durante a relação sexual, infecções (como gonorréia), secreção anormal, febre e calafrios, a mulher deve consultar o profissional da saúde habilitado.

■ Caso sua menstruação esteja atrasada e há sintomas de gravidez a mulher deve informar imediatamente o profissional da saúde habilitado.

■ Caso haja dor abdominal, dores durante a relação sexual, infecções (como gonorréia), secreção anormal, febre e calafrios, a mulher deve consultar o profissional da saúde habilitado.

■ Caso sua menstruação esteja atrasada e há sintomas de gravidez a mulher deve informar imediatamente o profissional da saúde habilitado.

■ Caso haja dor abdominal, dores durante a relação sexual, infecções (como gonorréia), secreção anormal, febre e calafrios, a mulher deve consultar o profissional da saúde habilitado.

■ Caso sua menstruação esteja atrasada e há sintomas de gravidez a mulher deve informar imediatamente o profissional da saúde habilitado.

■ Caso haja dor abdominal, dores durante a relação sexual, infecções (como gonorréia), secreção anormal, febre e calafrios, a mulher deve consultar o profissional da saúde habilitado.

inserir ao longo de seu eixo longitudinal. Isso pode ser executado através da fixação do lábio anterior ou posterior do colo uterino, dependendo se o útero estiver antevertido ou retrovertido.

Em caso de reações vasovagais após o uso do fórceps, pode ser dada anestesia local dentro e em torno do colo uterino.

Após examinar o útero para determinar sua posição, tamanho e condição, um espéculo é inserido dentro da vagina (da mesma maneira que o Exame de Papanicolau) e do colo do útero. O útero é mantido firme enquanto a profundidade é medida.

A histerometria deve ser realizada e a profundidade do útero marcada no cursor, pelo flange do tubo de inserção. O **ANDALAN SILVERFLEX** deve ser inserido suavemente até que o marcador toque o colo uterino, o que significará que a ponta do **ANDALAN SILVERFLEX** atingiu o fundo. O aplicador deve ser removido, deixando o dispositivo no útero. Após a inserção, os dois fios fixados ao dispositivo se estendem para dentro da vagina, de modo que a presença do dispositivo é sentida pelo profissional da saúde habilitado e será sentida no momento de autoexaminação. Os fios sobressalentes do canal cervical são então cortados, deixando 3 a 4 cm para fora do orifício cervical.

A histerometria deve ser realizada e a profundidade do útero marcada no cursor, pelo flange do tubo de inserção. O **ANDALAN SILVERFLEX** deve ser inserido suavemente até que o marcador toque o colo uterino, o que significará que a ponta do **ANDALAN SILVERFLEX** atingiu o fundo. O aplicador deve ser removido, deixando o dispositivo no útero. Após a inserção, os dois fios fixados ao dispositivo se estendem para dentro da vagina, de modo que a presença do dispositivo é sentida pelo profissional da saúde habilitado e será sentida no momento de autoexaminação. Os fios sobressalentes do canal cervical são então cortados, deixando 3 a 4 cm para fora do orifício cervical.

A histerometria deve ser realizada e a profundidade do útero marcada no cursor, pelo flange do tubo de inserção. O **ANDALAN SILVERFLEX** deve ser inserido suavemente até que o marcador toque o colo uterino, o que significará que a ponta do **ANDALAN SILVERFLEX** atingiu o fundo. O aplicador deve ser removido, deixando o dispositivo no útero. Após a inserção, os dois fios fixados ao dispositivo se estendem para dentro da vagina, de modo que a presença do dispositivo é sentida pelo profissional da saúde habilitado e será sentida no momento de autoexaminação. Os fios sobressalentes do canal cervical são então cortados, deixando 3 a 4 cm para fora do orifício cervical.

A histerometria deve ser realizada e a profundidade do útero marcada no cursor, pelo flange do tubo de inserção. O **ANDALAN SILVERFLEX** deve ser inserido suavemente até que o marcador toque o colo uterino, o que significará que a ponta do **ANDALAN SILVERFLEX** atingiu o fundo. O aplicador deve ser removido, deixando o dispositivo no útero. Após a inserção, os dois fios fixados ao dispositivo se estendem para dentro da vagina, de modo que a presença do dispositivo é sentida pelo profissional da saúde habilitado e será sentida no momento de autoexaminação. Os fios sobressalentes do canal cervical são então cortados, deixando 3 a 4 cm para fora do orifício cervical.

A histerometria deve ser realizada e a profundidade do útero marcada no cursor, pelo flange do tubo de inserção. O **ANDALAN SILVERFLEX** deve ser inserido suavemente até que o marcador toque o colo uterino, o que significará que a ponta do **ANDALAN SILVERFLEX** atingiu o fundo. O aplicador deve ser removido, deixando o dispositivo no útero. Após a inserção, os dois fios fixados ao dispositivo se estendem para dentro da vagina, de modo que a presença do dispositivo é sentida pelo profissional da saúde habilitado e será sentida no momento de autoexaminação. Os fios sobressalentes do canal cervical são então cortados, deixando 3 a 4 cm para fora do orifício cervical.

A histerometria deve ser realizada e a profundidade do útero marcada no cursor, pelo flange do tubo de inserção. O **ANDALAN SILVERFLEX** deve ser inserido suavemente até que o marcador toque o colo uterino, o que significará que a ponta do **ANDALAN SILVERFLEX** atingiu o fundo. O aplicador deve ser removido, deixando o dispositivo no útero. Após a inserção, os dois fios fixados ao dispositivo se estendem para dentro da vagina, de modo que a presença do dispositivo é sentida pelo profissional da saúde habilitado e será sentida no momento de autoexaminação. Os fios sobressalentes do canal cervical são então cortados, deixando 3 a 4 cm para fora do orifício cervical.

A histerometria deve ser realizada e a profundidade do útero marcada no cursor, pelo flange do tubo de inserção. O **ANDALAN SILVERFLEX** deve ser inserido suavemente até que o marcador toque o colo uterino, o que significará que a ponta do **ANDALAN SILVERFLEX** atingiu o fundo. O aplicador deve ser removido, deixando o dispositivo no útero. Após a inserção, os dois fios fixados ao dispositivo se estendem para dentro da vagina, de modo que a presença do dispositivo é sentida pelo profissional da saúde habilitado e será sentida no momento de autoexaminação. Os fios sobressalentes do canal cervical são então cortados, deixando 3 a 4 cm para fora do orifício cervical.

A histerometria deve ser realizada e a profundidade do útero marcada no cursor, pelo flange do tubo de inserção. O **ANDALAN SILVERFLEX** deve ser inserido suavemente até que o marcador toque o colo uterino, o que significará que a ponta do **ANDALAN SILVERFLEX** atingiu o fundo. O aplicador deve ser removido, deixando o dispositivo no útero. Após a inserção, os dois fios fixados ao dispositivo se estendem para dentro da vagina, de modo que a presença do dispositivo é sentida pelo profissional da saúde habilitado e será sentida no momento de autoexaminação. Os fios sobressalentes do canal cervical são então cortados, deixando 3 a 4 cm para fora do orifício cervical.

A histerometria deve ser realizada e a profundidade do útero marcada no cursor, pelo flange do tubo de inserção. O **ANDALAN SILVERFLEX** deve ser inserido suavemente até que o marcador toque o colo uterino, o que significará que a ponta do **ANDALAN SILVERFLEX** atingiu o fundo. O aplicador deve ser removido, deixando o dispositivo no útero. Após a inserção, os dois fios fixados ao dispositivo se estendem para dentro da vagina, de modo que a presença do dispositivo é sentida pelo profissional da saúde habilitado e será sentida no momento de autoexaminação. Os fios sobressalentes do canal cervical são então cortados, deixando 3 a 4 cm para fora do orifício cervical.

A histerometria deve ser realizada e a profundidade do útero marcada no cursor, pelo flange do tubo de inserção. O **ANDALAN SILVERFLEX** deve ser inserido suavemente até que o marcador toque o colo uterino, o que significará que a ponta do **ANDALAN SILVERFLEX** atingiu o fundo. O aplicador deve ser removido, deixando o dispositivo no útero. Após a inserção, os dois fios fixados ao dispositivo se estendem para dentro da vagina, de modo que a presença do dispositivo é sentida pelo profissional da saúde habilitado e será sentida no momento de autoexaminação. Os fios sobressalentes do canal cervical são então cortados, deixando 3 a 4 cm para fora do orifício cervical.

A histerometria deve ser realizada e a profundidade do útero marcada no cursor, pelo flange do tubo de inserção. O **ANDALAN SILVERFLEX** deve ser inserido suavemente até que o marcador toque o colo uterino, o que significará que a ponta do **ANDALAN SILVERFLEX** atingiu o fundo. O aplicador deve ser removido, deixando o dispositivo no útero. Após a inserção, os dois fios fixados ao dispositivo se estendem para dentro da vagina, de modo que a presença do dispositivo é sentida pelo profissional da saúde habilitado e será sentida no momento de autoexaminação. Os fios sobressalentes do canal cervical são então cortados, deixando 3 a 4 cm para fora do orifício cervical.

A histerometria deve ser realizada e a profundidade do útero marcada no cursor, pelo flange do tubo de inserção. O **ANDALAN SILVERFLEX** deve ser inserido suavemente até que o marcador toque o colo uterino, o que significará que a ponta do **ANDALAN SILVERFLEX** atingiu o fundo. O aplicador deve ser removido, deixando o dispositivo no útero. Após a inserção, os dois fios fixados ao dispositivo se estendem para dentro da vagina, de modo que a presença do dispositivo é sentida pelo profissional da saúde habilitado e será sentida no momento de autoexaminação. Os fios sobressalentes do canal cervical são então cortados, deixando 3 a 4 cm para fora do orifício cervical.

A histerometria deve ser realizada e a profundidade do útero marcada no cursor, pelo flange do tubo de inserção. O **ANDALAN SILVERFLEX** deve ser inserido suavemente até que o marcador toque o colo uterino, o que significará que a ponta do **ANDALAN SILVERFLEX** atingiu o fundo. O aplicador deve ser removido, deixando o dispositivo no útero. Após a inserção, os dois fios fixados ao dispositivo se estendem para dentro da vagina, de modo que a presença do dispositivo é sentida pelo profissional da saúde habilitado e será sentida no momento de autoexaminação. Os fios sobressalentes do canal cervical são então cortados, deixando 3 a 4 cm para fora do orifício cervical.

A histerometria deve ser realizada e a profundidade do útero marcada no cursor, pelo flange do tubo de inserção. O **ANDALAN SILVERFLEX** deve ser inserido suavemente até que o marcador toque o colo uterino, o que significará que a ponta do **ANDALAN SILVERFLEX** atingiu o fundo. O aplicador deve ser removido, deixando o dispositivo no útero. Após a inserção, os dois fios fixados ao dispositivo se estendem para dentro da vagina, de modo que a presença do dispositivo é sentida pelo profissional da saúde habilitado e será sentida no momento de autoexaminação. Os fios sobressalentes do canal cervical são então cortados, deixando 3 a 4 cm para fora do orifício cervical.

A histerometria deve ser realizada e a profundidade do útero marcada no cursor, pelo flange do tubo de inserção. O **ANDALAN SILVERFLEX** deve ser inserido suavemente até que o marcador toque o colo uterino, o que significará que a ponta do **ANDALAN SILVERFLEX** atingiu o fundo. O aplicador deve ser removido, deixando o dispositivo no útero. Após a inserção, os dois fios fixados ao dispositivo se estendem para dentro da vagina, de modo que a presença do dispositivo é sentida pelo profissional da saúde habilitado e será sentida no momento de autoexaminação. Os fios sobressalentes do canal cervical são então cortados, deixando 3 a 4 cm para fora do orifício cervical.

A histerometria deve ser realizada e a profundidade do útero marcada no cursor, pelo flange do tubo de inserção. O **ANDALAN SILVERFLEX** deve ser inserido suavemente até que o marcador toque o colo uterino, o que significará que a ponta do **ANDALAN SILVERFLEX** atingiu o fundo. O aplicador deve ser removido, deixando o dispositivo no útero. Após a inserção, os dois fios fixados ao dispositivo se estendem para dentro da vagina, de modo que a presença do dispositivo é sentida pelo profissional da saúde habilitado e será sentida no momento de autoexaminação. Os fios sobressalentes do canal cervical são então cortados, deixando 3 a 4 cm para fora do orifício cervical.

A histerometria deve ser realizada e a profundidade do útero marcada no cursor, pelo flange do tubo de inserção. O **ANDALAN SILVERFLEX** deve ser inserido suavemente até que o marcador toque o colo uterino, o que significará que a ponta do **ANDALAN SILVERFLEX** atingiu o fundo. O aplicador deve ser removido, deixando o dispositivo no útero. Após a inserção, os dois fios fixados ao dispositivo se estendem para dentro da vagina, de modo que a presença do dispositivo é sentida pelo profissional da saúde habilitado e será sentida no momento de autoexaminação. Os fios sobressalentes do canal cervical são então cortados, deixando 3 a 4 cm para fora do orifício cervical.

A histerometria deve ser realizada e a profundidade do útero marcada no cursor, pelo flange do tubo de inserção. O **ANDALAN SILVERFLEX** deve ser inserido suavemente até que o marcador toque o colo uterino, o que significará que a ponta do **ANDALAN SILVERFLEX** atingiu o fundo. O aplicador deve ser removido, deixando o dispositivo no útero. Após a inserção, os dois fios fixados ao dispositivo se estendem para dentro da vagina, de modo que a presença do dispositivo é sentida pelo profissional da saúde habilitado e será sentida no momento de autoexaminação. Os fios sobressalentes do canal cervical são então cortados, deixando 3 a 4 cm para fora do orifício cervical.

A histerometria deve ser realizada e a profundidade do útero marcada no cursor, pelo flange do tubo de inserção. O **ANDALAN SILVERFLEX** deve ser inserido suavemente até que o marcador toque o colo uterino, o que significará que a ponta do **ANDALAN SILVERFLEX** atingiu o fundo. O aplicador deve ser removido, deixando o dispositivo no útero. Após a inserção, os dois fios fixados ao dispositivo se estendem para dentro da vagina, de modo que a presença do dispositivo é sentida pelo profissional da saúde habilitado e será sentida no momento de autoexaminação. Os fios sobressalentes do canal cervical são então cortados, deixando 3 a 4 cm para fora do orifício cervical.

A histerometria deve ser realizada e a profundidade do útero marcada no cursor, pelo flange do tubo de inserção. O **ANDALAN SILVERFLEX** deve ser inserido suavemente até que o marcador toque o colo uterino, o que significará que a ponta do **ANDALAN SILVERFLEX** atingiu o fundo. O aplicador deve ser removido, deixando o dispositivo no útero. Após a inserção, os dois fios fixados ao dispositivo se estendem para dentro da vagina, de modo que a presença do dispositivo é sentida pelo profissional da saúde habilitado e será sentida no momento de autoexaminação. Os fios sobressalentes do canal cervical são então cortados, deixando 3 a 4 cm para fora do orifício cervical.

A histerometria deve ser realizada e a profundidade do útero marcada no cursor, pelo flange do tubo de inserção. O **ANDALAN SILVERFLEX** deve ser inserido suavemente até que o marcador toque o colo uterino, o que significará que a ponta do **ANDALAN SILVERFLEX** atingiu o fundo. O aplicador deve ser removido, deixando o dispositivo no útero. Após a inserção, os dois fios fixados ao dispositivo se estendem para dentro da vagina, de modo que a presença do dispositivo é sentida pelo profissional da saúde habilitado e será sentida no momento de autoexaminação. Os fios sobressalentes do canal cervical são então cortados, deixando 3 a 4 cm para fora do orifício cervical.